

Recomendaciones y cuidados adicionales:



Tienes esta información en nuestra web:

<https://hospitaluvrocio.es/entrada-blog/hojas-informativas-2/>

Contáctanos

955 012 882

RECOMENDACIONES
AL ALTA
VENDAJE ESCAYOLADO



VENDAJE ESCAYOLADO

A su hijo se le ha colocado un vendaje escayolado. Para evitar posibles complicaciones debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1 Los 4 ó 5 primeros días, mantener el miembro escayolado elevado para evitar que se hinche en su extremidad. Para dormir ayúdese de cojines

2 En los primeros días, ha de mover los dedos activamente, él sólo. Si es pequeño, ayúdelo. Activa la circulación y evita que se hinche.

3 No recorte la escayola. Si le molesta en alguna zona, acuda a su traumatólogo o a su médico.

4 No debe introducir dentro del yeso agujas o instrumentos finos por picor. Podrían producir se infecciones y otras lesiones.

5 No apoyar el yeso en el suelo, cuando se trate del miembro inferior, sin autorización. Puede afectar la inmovilización.

6 Si se ha autorizado el apoyo con el yeso del miembro inferior afectado, tiene que haber pasado al menos 48h, para que esté lo suficientemente seco el vendaje escayolado.

7

Evite que se moje la escayola. Puede afectar seriamente la inmovilización.

8

No olvide acompañar siempre la documentación y el informe que se le entregó, para cualquier nueva consulta que tenga que realizar.

ACUDIRÁ A SU CENTRO DE SALUD O A UN SERVICIO DE URGENCIAS, SI:

- Aumento del dolor.
- Entumecimiento, hormigueo o molestias en la mano, pie o dedos.
- Inflamación y sensación de punzadas.
- Cambios de coloración del yeso, manchas rojas o amarillas.
- Fiebre no asociada con otra enfermedad.
- Cambios en la piel alrededor del yeso, piel roja o con mal olor.

